

佐匹克隆 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E4_BD_90_E5_8C_B9_E5_85_8B_E9_c22_312976.htm 药品名称佐匹克隆药物别名吡嗪哌酯，IMOVANE，IMOVANCF 英文名

称Zopiclone 类别其他催眠药制剂膜包衣片：每片7.5mg。分子式成分药理及应用本品具有催眠、镇静、抗焦虑、肌肉松弛与抗惊厥作用，其催眠作用迅速，并可延长睡眠时间，提高睡眠质量，减少夜间醒觉次数和早醒次数。口服后吸收迅速，1.5~2小时达血药峰浓度，可迅速分布到全身各组织。血浆蛋白结合率低，约为45%。经肝脏代谢，其N-氧化物有药理活性。最后自肾脏排出，少量自粪便排出。t_{1/2}约为5小时。老年人肝脏代谢降低，t_{1/2}延长。肝硬化者代谢减慢，应调整其剂量。适用于治疗失眠症。用法用量口服：7.4mg，临睡前服。老年人，开始服3.74mg，必要时可加至7.5mg。肝功能不良者用3.75mg。注重事项（1）不良反应有白天嗜睡、头昏、口苦口干、肌无力、健忘、易怒好斗或精神紊乱。（2）长期用药后忽然停药可有戒断现象出现，有轻度的激动、焦虑、肌痛、反跳性失眠、恶梦等。过量可致昏睡或昏迷，但比一般苯二氮类轻，毒性亦小。（3）对本品过敏者、呼吸功能不全者禁用。15岁以下儿童不宜用。严重肝功能不良者应调整剂量。（4）严禁同时饮酒或饮含酒精的饮料。（5）机械操作人员与车辆司机慎用。（6）与其它中枢抑制药（如苯二氮类与巴比妥类）合用，可增加中枢抑制作用，戒断综合征也可增加。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com