

右旋糖酐10 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_B3\\_E6\\_97\\_8B\\_E7\\_B3\\_96\\_E9\\_c22\\_313094.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8F_B3_E6_97_8B_E7_B3_96_E9_c22_313094.htm) 药品名称右旋糖酐10  
英文名称Dextran 10 类别血浆及血浆代用品制剂右旋糖酐10（小分子右旋糖酐）葡萄糖注射液；每瓶30g（500ml），50g（500ml）；均含葡萄糖5%。右旋糖酐10（小分子右旋糖酐）氯化钠注射液：每瓶30g（500ml），50g（500ml）；均含氯化钠0.9%。药理及应用作用与右旋糖酐40相似，但其改善微循环、防止弥散性血管内凝血作用强于右旋糖酐40。其维持血容量和升压作用较右旋糖酐40为短，约3小时左右。适用于急性失血性休克、创伤及烧伤性休克、急性心肌梗死、心绞痛、脑血栓形成、脑供血不全、血栓闭塞性脉管炎、雷诺病等。此外，术前有低血容量以及硬膜外麻醉后所致低血压者均可使用本品升压。用法用量静滴：速度为5~15ml/分，血压上升后，可酌情减慢。每次500~1000ml。注重事项（1）偶见发热、荨麻疹、血压降低、呼吸困难、胸闷、血尿等不良反应。（2）用量过大可致贫血、低血浆蛋白和凝血时间延长等现象，急救大出血时，最好能与全血并用。（3）本品利尿作用较强，故不宜用于肾病患者。（4）血小板减少症、出血性疾病患者禁用，心功能不全患者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)