

骨化三醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E9_AA_A8_E5_8C_96_E4_B8_89_E9_c22_313099.htm 药品名称骨化三醇药物别名罗钙全，1，25-Dihydroxycholecalciferol，Rocaltrol 英文名称Calcitriol 类别维生素A、D属药物制剂胶囊剂：每粒0.25 μg；0.5 μg。药理及应用作用同维生素D3。口服吸收快，3~6小时达高峰，t_{1/2}约3~6小时，经7小时后尿钙浓度增加，单次口服剂量可持续药理活性3~5日。应用于甲状旁腺功能低下症及血液透析患者的肾性营养不良。用法用量口服剂量应根据患者的血钙浓度来决定。（1）血液透析患者的肾性营养不良如患者血钙浓度正常或略低，口服1日0.25 μg。如2~4周内生化指标及病情无明显改变，则一日剂量可达到0.5 μg。每周应测两次血钙浓度，随时调整剂量。大多数血透患者用量在1日0.5~1 μg。（2）甲状旁腺功能低下儿童1~5岁1日0.25~0.75 μg，6岁以上和成人，1日0.5~2 μg（用量须个体化）。注重事项（1）用药过量可引起高血钙症，表现为眩晕、恶心、呕吐、腹痛、肌无力、精神紊乱、烦渴、多尿、骨痛、肾结石、肾钙质沉着，严重可导致心律不全等。（2）用药过程中应测血钙、磷浓度，与高血钙相关的疾病忌用。（3）不能与维生素D类同时应用。同时服用巴比妥类或苯妥英钠可加速本品代谢；考来烯胺可减少本品吸收。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com