

氟米龙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_9F\\_E7\\_B1\\_B3\\_E9\\_BE\\_99\\_c22\\_313190.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E6_B0_9F_E7_B1_B3_E9_BE_99_c22_313190.htm) 药品名称氟米龙 药物别名 (Oxylone) 英文名称Fluorometholone 类别肾上腺皮质激素及促肾上腺皮质激素制剂 滴眼剂 0.1% 分子式成分每毫升滴眼剂含1 mg氟米龙、14 mg液膜成份(聚乙烯乙醇)、40 μg氯化苄烷铵及依地酸二钠、氯化钠、一价磷酸钠、聚氧乙烯山梨醇脂、肪酸脂(表面活性剂)和纯净水 药理毒理本药可抑制具有机械、化学或免疫特性等刺激因子所致的炎症，其作用机理不明确，但一般认为，皮质类固醇可诱导磷酸脂酶A2的抑制蛋白(即脂皮质素)，这些抑制蛋白是通过抑制炎症介质如前列腺素和白三烯的共同前体花生四烯酸的释放，进而控制其炎症介质的生物合成。另外，本药对眼压的影响比地塞米松小。适应症对糖皮质激素敏感的睑球结膜、角膜及其它眼前段组织的炎症。不良反应长期使用可能引起眼压升高，甚至青光眼。偶致视神经损害，后囊膜下白内障，继发性眼部感染，眼球穿孔和延缓伤口愈合。用法用量滴眼：1-2滴/次，每日2-4次，治疗开始的24-48小时可酌情增加至每小时2滴，应逐步减量停药。注重事项急性单纯疱疹病毒性角膜炎，眼组织的真菌感染，牛痘及水痘感染，病毒性角膜和结膜感染，结核。对该药成份过敏者禁用。长期眼部使用糖皮质激素可能导致真菌感染，角膜溃疡者尤甚。治疗期间，应常测眼内压。有单疱病毒感染病史者、眼部急性化脓性感染者、2岁或以下儿童及孕妇慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)