

阿伐斯汀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E9_98_BF_E4_BC_90_E6_96_AF_E6_c22_313213.htm 药品名称阿伐斯汀药物别名艾克维斯定，新敏灵，新敏乐，DUACT，SEMPREX 英文名称Acrivastine〔 〕类别抗组胺药制剂剂型：每胶囊8mg。分子式成分药理及应用本品为曲普利定（triprolidine）的衍生物，具有选择性地阻断组胺H1受体的作用，具有良好的抗组胺作用。因不易通过血脑屏障，故无镇静作用。也无抗毒蕈碱样胆碱作用。口服后吸收良好，1.5小时后血药浓度达峰值。有少量在肝中被代谢，代谢产物仍具有药理活性。由尿排泄，原形药物占80%。t_{1/2}为1.5小时。本品可用于过敏性鼻炎及荨麻疹等。用法用量口服：8mg / 次，1日3次。注重事项较少不良反应。偶可引起皮疹。常饮酒者或服用中枢神经系统抑制药后服用本品，则本品的不良反应可增多。肾功能低下者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com