

倍氯米松 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_80_8D_E6_B0_AF_E7_B1_B3_E6_c22_313228.htm 药品名称倍氯米松药物别名（倍氯松，倍氯美松双丙酸酯，氯倍他美松二丙酸酯，BeclomethasoneDipropionate，BECOTIDE 英文名

称Beclomethasone 类别肾上腺皮质激素及促肾上腺皮质激素性
状常用其丙酸酯，为白色或类白色粉末；无臭。在两酮或氯仿中易溶，在甲醇中溶解，在乙醇中略溶，在水中几乎不溶。制剂软膏：0.025%。气雾剂：每瓶200揆，每揆含丙酸倍氯米松50 μg分子式成分药理及应用系强效外用糖皮质激素类药物，具有抗炎、抗过敏和止痒等作用，能抑制支气管渗出物，消除支气管粘膜肿胀，解除支气管痉挛。对皮肤血管收缩作用远比氢化可的松强。局部抗炎作用是氟轻松和曲安西龙的5倍。亲脂性较强，易渗透，涂于患处30分钟后即生效，软膏剂的t_{1/2}约为3小时。钠潴留及肝糖原沉着作用很弱，也无雄性、雌性及蛋白同化激素样的作用，对体暖和排尿也无明显影响。因此局部外用不会抑制人体皮质功能和因皮质功能紊乱所引起的不良反应。外用可治疗各种炎症皮肤病如湿疹、过敏性皮炎、神经性皮炎、接触性皮炎、牛皮癣、瘙痒等。气雾剂可用于慢性及过敏性鼻炎等。用法用量乳膏或软膏：每日涂患处2~3次，必要时包扎之。气雾剂：成人一般每次喷药0.05~0.1mg（每揆1次约喷出主药0.05mg），1日3次。严重病例用全身性皮质激素控制症状后再用本品治疗，每日最大量不超过1mg。儿童用量按年龄酌减每日最大量不超过0.8mg。症状缓解后逐减量。注重事项（1）气雾剂只用于慢性哮喘，急性发作时应使用较大剂量水溶性皮质

激素，或用支气管扩张剂和抗组胺类药，待控制症状后再改用本品气雾剂治疗。（2）使用本品后应在哮喘控制良好的情况下逐渐停用口服皮质激素，一般在本气雾剂治疗4~5天后才慢慢减量停用。（3）气雾剂对个别病人有刺激感，咽喉部出现白色念珠菌感染。但吸后立即漱口可减轻刺激感，并可用局部抗真菌药控制感染。（4）本品乳膏不宜长期密封给药，因易引起红斑、丘疹、痂皮等，此时应减少用药量。不宜用于皮肤结核、疮疹、水痘、皮肤化脓性感染、溃疡、二度以上烫伤、冻伤、湿疹性外耳道炎等。本品不能用于眼科，对孕妇及婴儿须慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com