

异丙嗪〔典〕〔基〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_BC_82_E4_B8_99_E5_97_AA_E3_c22_313235.htm 药品名称异丙嗪〔典〕〔基〕

药物别名非那根，抗胺萁，盐酸普鲁米近，PHENERGAN 英文名称Promethazine 类别抗组胺药性状常用其盐酸盐，为白色或几乎白色粉末或颗粒；几乎无臭；味苦；在空气中日久变为蓝色。在水中极易溶解，在乙醇或氯仿中易溶，在丙酮或乙醚中几乎不溶。制剂片剂：每片12.5mg；25mg。注射液：每支25mg（1ml）；50mg（2ml）。分子式成分药理及应用为吩噻嗪类抗组胺药。作用较苯海拉明持久，亦具明显的中枢安定作用，但比氯丙嗪弱；能增强麻醉药、催眠药、镇痛药和局部麻醉药的作用，降低体温，有镇吐作用。适用于各种过敏症（如哮喘、荨麻疹等）、孕期呕吐、乘舟等引起的眩晕等。亦可与氨茶碱等合用治疗哮喘，与氯丙嗪等配成冬眠注射液用于人工冬眠。口服，每次12.5～25mg，1日2～3次；肌注，每次25～50mg；亦能静注。因有刺激作用，不宜皮下注射。注重事项（1）副作用为困倦、思睡、口干，偶有胃肠刺激症状、皮炎。（2）避免与哌替啶（度冷丁）、阿托品多次合用。（3）不宜与氨茶碱混合注射。（4）驾驶员、机械操作人员和运动员禁用。（5）肝功能减退者慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com