

甘油 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022_E7_94_98_E6_B2_B9_c22_313238.htm 药品名称甘油药物别名丙三醇

，Glycerin 英文名称Glycerol 类别泻药性状无色、 澄明的糖浆状液体；味甜，随后有温热的感觉。有引湿性，水溶液（1

10）显中性反应。与水及乙醇均能任意混溶，在氯仿或乙醚中不溶。制剂栓剂：由硬脂酸钠（肥皂）为硬化剂，吸收甘油而制成（肥皂的刺激性对泻下也有一定作用）。含甘油约90%，大号每个约重3g，小号每个约重1.5g。药理及应用本品能润滑并刺激肠壁，软化大便，使易于排出，便秘时可用本品栓剂或50%溶液灌肠。又由于本品可提高血浆渗透压，可做为脱水剂，用于降低颅内压和眼压。外用有吸湿作用，并使局部组织软化，用于冬季皮肤干燥破裂等。又用为溶媒，可溶解硼砂、硼酸、苯酚、鞣酸、水杨酸等，可使苯酚的腐蚀性降低，常与苯酚配成制剂。此外还用为栓剂的赋形剂（与明胶合用）。用法用量（1）便秘 使用栓剂，每次1粒塞入肛门（成人用大号栓，小儿用小儿桂），对小儿及年老体弱者较为适宜。也可用本品50%溶液灌肠。（2）降眼压和降颅内压 口服50%甘油溶液（含0.9%氯化钠），每次200ml，日服1次，必要时日服2次，但要间隔6~8小时。注意事项口服有稍微副作用，如头痛，咽部不适、口渴、恶心、呕吐、腹泻及血压稍微下降等。空腹服用副作用较明显。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com