

链脱酶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E9_93_BE_E8_84_B1_E9_85_B6_c22_313248.htm 药品名称链脱酶药物别名脱氧核糖核酸酶，DNA酶，Deoxyribonuclease，DNAase 英文名称Streptodornase 类别酶类药物性状为类白色粉末，易溶于水，在室温中或过度稀释可迅速灭活。制剂注射用链脱酶：每支含本品25000单位；10万单位，供局部或注入用。药理及应用具有使脱氧核糖核酸和脱氧核糖核蛋白解聚的作用，吸入本品气溶胶可使含有大量脱氧核糖核蛋白的渗出物和浓痰液化，易于咳出。用于支气管扩张、肺脓疡等，吸入或肌注。若胸膜腔有纤维蛋白膜块沉积或有粘性渗出物堵塞，可直接行腔内注射。用法用量（1）吸入或腔内注射：1次可达5万单位。（2）肌注每次：100万单位，2日1次。（3）局部涂擦：浓度为1250～2500单位/ml。常与链激酶合用。注意事项（1）注射后可能引起无力、胃肠道反应，偶见皮疹。（2）急性化脓性蜂窝织炎、有支气管胸腔瘘管的活动性结核患者忌用。（3）禁与肝素、枸橼酸盐等配伍。（4）溶液须临用前配制，贮存温度不得超过4℃。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com