

复方地芬诺酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_A4_8D_E6_96_B9_E5_9C_B0_E8_c22_313263.htm 药品名称复方地芬诺酯
药物别名苯乙哌啶 Lomotil 英文名称Compound

Diphenoxylate 类别止泻药制剂复方地芬诺酯片：每片含本品2.5mg、硫酸阿托品0.025mg；复方地芬诺酯溶液剂：每5ml含本品2.5mg，阿托品0.025mg。分子式成分盐酸地芬诺酯、硫酸阿托品。药理毒理本品可直接作用于肠平滑肌，通过抑制肠粘膜感受器，消除局部粘膜的蠕动反射而减弱肠蠕动，同时可增加肠的节段性收缩，使肠内容物通过迟缓，利于肠液的再吸收，显示较强的止泻作用。药动学口服吸收迅速，2小时达血浓高峰。在人体内主要代谢物为地芬诺辛（diphenoxylate），其止泻作用比母体强5倍。T_{1/2}为2.5小时，地芬诺辛为12~24小时。适应症急、慢性功能性腹泻及慢性肠炎等。不良反应恶心、头晕、头痛、嗜睡、失眠、抑郁、皮疹、腹胀、大肠扩张及肠梗阻等。大剂量可产生吗啡样欣快感，长期服用有依赖性。相互作用与阿托品合用，可减少依赖性发生。可增加单胺氧化酶抑制剂、巴比妥类、阿片类和其他中枢神经抑制药的毒性。用法用量口服：成人，1~2片/次，3~4次/日；2~5岁小儿每次服溶液4ml，3次/日；5~8岁儿童服溶液4ml/次，4次/日。注重事项妊娠C类。溃疡性结肠炎、肝硬化者慎用。服用成瘾性镇痛药者及腹泻早期和腹胀者亦应慎用。2岁以下小儿禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com