

双链酶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8F_8C_E9_93_BE_E9_85_B6_c22_313274.htm

药品名称双链酶药物别名sk-sd 英文名称streptokinase-strentodornase 类别酶类药物性状白色或类白色结晶性 or 无定形粉末，能溶于水。制剂外用粉剂：每g内含sk10000单位，sd5000单位，适量磺酰胺。外用片剂：每片含sk10000单位，sd5000单位。口含片剂：每片含sk10000单位，sd5000单位。注射用双链酶：每支含sk、sd各2500单位或各5000单位。药理毒理链激酶即溶栓酶，具有溶解血栓血块的作用；链脱酶则能分解大分子的脱氧核糖核酸及核蛋白（这两种在脓液及痰液中约占30%~70%左右），因而本品可溶解血栓、血块，清洁创面，清除炎症，液化痰液及肢液，使其易于排除及引流。用法用量（1）撒粉或湿敷 用于各种伤口及术后感染，一般化脓性疾患（如蜂窝织炎、乳腺炎等）、慢性溃疡、各种烫伤感染等，创口清洗后在湿润状态下撒一薄层药粉，覆以湿纱布或凡士林纱布；或将外用片1片溶于冷开水10ml中，采用湿敷、滴注等方法用于患处，上覆以显纱布或凡士林纱布。（2）口含 每日4次，每次含1片，用于多种炎症的缓解，消除水肿、血肿、脓肿等，或用于支气管炎（液化分泌物）、肺脓疡。（3）局部注射：如球后注射、球结膜下注射，用于眼前房出血、玻璃体积血等。每周2~3次，每次1000~2000单位。（4）滴用 浓度为1000单位/ml，每1~2小时滴1次，用于化脓性中耳炎、化脓性齿龈炎、卡他性鼻炎、卡他性结膜炎等。注重事项（1）使用时如大量出血，即应暂停使用，必要时给予止血药。

（2）一些杀菌剂或重金属剂如呋喃西林、红汞等对酶有破坏

作用，不宜在一起应用。（3）由外用片或注射制备的溶液需置冰箱中保存，药效可保持24小时。（4）不能作静脉注射。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com