

二羟丙茶碱注射液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BE_9F_E4_B8_99_E8_c22_313278.htm 药品名称二羟丙茶碱注射液 药物别名喘定，甘油茶碱 英文名称Diprophylline 类别其他药物制剂喘定，甘油茶碱 药理毒理作用与氨茶碱相同，具有扩张支气管，扩张冠脉及强心利尿作用。 药动学口服Tmax约1h，大部分以原型自尿液排出，T1/2约为1.8h。 适应症支气管哮喘、喘息性支气管炎、慢性肺气肿以及心源性水肿、心绞痛等，尤其是伴有明显心动过速或不能耐受茶碱者。 不良反应可有多尿、口干、头痛、失眠、心悸和胃肠道症状等。 相互作用不宜与氨茶碱合用。 用法用量肌注：0.25g~0.5g/次，1.5g/日。 静注：0.25g~0.5g/次。 静滴：1g~2g/日。 注重事项严重心肌炎和急性心肌梗死患者慎用。 大剂量可致中枢兴奋症状，加服镇静催眠药可预防。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com