

地芬诺酯〔典〕〔基〕PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9C\\_B0\\_E8\\_8A\\_AC\\_E8\\_AF\\_BA\\_E9\\_c22\\_313280.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_9C_B0_E8_8A_AC_E8_AF_BA_E9_c22_313280.htm) 药品名称地芬诺酯〔典〕〔基〕药物别名苯乙哌啶，氰苯哌酯，止泻宁 英文名称Phenolphthalein 类别止泻药性状常用其盐酸盐，为白色或几乎白色的粉末或结晶性粉末；无臭。在氯仿中易溶，在甲醇中溶解，在乙醇或丙酮中略溶，在水或乙醚中几乎不溶。熔点221~226。制剂复方地芬诺酯片（LOMOTIL）：每片含盐酸地芬诺酯2.5mg，硫酸阿托品0.025mg。每次服1~2片，每日3次。药理及应用对肠道作用类似吗啡，可直接作用于肠平滑肌，通过抑制肠粘膜感受器，消除局部粘膜的蠕动反射而减弱肠蠕动，同时可增加肠的节段性收缩，使肠内容物通过延迟，有利于肠内水分的吸收。适用于急、慢性功能性腹泻及慢性肠炎等。大剂量（1次40~60mg）可产生欣快感，长期服用可致依赖性（但用常量与阿托品合用进行短期治疗，则产生依赖性的可能性很小）。用法用量口服，1次2.5~5mg，1日2~4次。至腹泻被控制时，应即减少剂量。注重事项（1）服药后偶见口干、腹部不适、恶心、呕吐、思睡、烦躁、失眠等，减量或停药后即消失。（2）可增强巴比妥类、阿片类及其它中枢抑制药的作用，故不宜合用。（3）肝功能不全患者及正在眼用成瘾性药物患者宜慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)