

超氧化物歧化酶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E8\\_B6\\_85\\_E6\\_B0\\_A7\\_E5\\_8C\\_96\\_E7\\_c22\\_313298.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E8_B6_85_E6_B0_A7_E5_8C_96_E7_c22_313298.htm) 药品名称超氧化物歧化酶 药物别名sod，orgotein，ormetein 英文名称superoxide dismutase 类别酶类药物制剂注射用超氧化物歧化酶：每支4mg；8mg。药理及应用自由基可造成对机体的损害（参见第22章1.3）。本品能清除炎症中伴随产生的自由基，显示抗炎作用；无免疫调节及镇痛作用，也不影响前列腺素等炎症介质的合成。可用于前列腺癌或膀胱癌放射治疗后遗症、类风湿性关节炎。用法用量慢性风湿性关节炎，肌注，1次8mg，每周3~4次。骨关节炎，关节腔内注射，1次4mg，每2周1次。放射治疗后遗症如放射性膀胱炎，深部肌注，1次4mg，在放疗后半小时内注射。注重事项注射后少数可出现局部疼痛、荨麻疹和蛋白尿等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)