

葡萄糖酸亚铁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_E8\\_91\\_A1\\_E8\\_90\\_84\\_E7\\_B3\\_96\\_E9\\_c22\\_313309.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022_E8_91_A1_E8_90_84_E7_B3_96_E9_c22_313309.htm) 药品名称葡萄糖酸亚铁 英文名称ferrous gluconate 类别抗贫血药性状灰绿色或微黄色结晶性粉末或颗粒；有焦糖臭，味涩。在热水中易溶，在水中溶解，在乙醇中几乎不溶。制剂片剂（糖衣片）：每片0.1g；0.3g。胶囊剂：每胶囊0.25g；0.3g；0.4g。糖浆：0.25g（10ml）；0.3g（10ml）。分子式成分药理及应用本品口服后经十二指肠吸收，对胃肠道刺激性小，作用温和、铁利用率高，起效快。主要用于各种原因引起的缺铁性贫血，如营养不良、慢性失血、月经过多、妊娠儿童生长期等所致的缺铁性贫血。贮存密闭避光于干燥处存放。用法用量口服，预防，成人，每次0.4～0.6g，1日3次；儿童，每次0.1g，1日2次。治疗，成人，每次0.3～0.6g，1日3次；儿童，每次0.1～0.2g，1日3次。注意事项偶有胃肠刺激症状，饭后服用可减轻胃肠刺激症状。服药后两小时内忌饮茶和进食含鞣酸的食物。细菌感染患者不宜应用本品。服药后排黑色粪便易与大便潜血混淆。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)