

顺尔宁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E9_A1_BA_E5_B0_94_E5_AE_81_c22_313320.htm 药品名称顺尔宁 药物别名孟鲁司特钠 英文名称Montelukast Sodium 类别其他药物制剂咀嚼片，包衣片，5、10mg/片。药理毒理是一种口服有效的选择性白三烯受体拮抗剂，能特异性抑制半胱氨酰白三烯受体。适应症适用于成人和儿童哮喘的预防和长期治疗，包括预防白天和夜间的哮喘症状，治疗对阿司匹林敏感的哮喘患者以及预防运动引起的支气管收缩。不良反应本药的一般耐受性良好，副作用较稍微，通常不需中止治疗。应用本药总的副作用发生率与安慰剂相似。临床研究已评价了本药在2600名15岁及15岁以上患者的应用情况。在两项设计类似，以安慰剂作对照的12周临床试验中，本药治疗组有 1%的患者出现与用药有关的腹痛和头痛。其发生率高于接受安慰剂治疗的患者。但两组患者上述副作用的发生率无显著差异。544名患者在临床试验中累积使用本药至少6个月，253名患者用药一年，21名用药达2年，长期用药的不良反应情况与上述无异。已经评价了本药在约320名6~14岁儿童患者的使用情况，在一项以安慰剂作对照，为期8周的临床试验中，只有头痛是与药物有关的，在大于1%患者中出现此副作用，其发生率高于接受安慰剂治疗的患者，但两组患者上述副作用的发生率无显著差异。143名儿科患者累积使用本药至少3个月，44名用药达6个月或更久，长期用药的不良反应情况与上述无异。相互作用可与其他常规用于预防及长期治疗哮喘的药物合用。在药物相互作用的研究中，孟鲁司特钠的临床推荐用量对下列药物的药代动力学无重要影响：茶碱、泼尼松、

泼尼松龙，口服避孕药（炔雌醇/炔诺酮35/1），特非那定，地高辛和华法令。合用苯巴比妥的受试者，孟鲁司特钠的血浆浓度曲线下面积（AUC）减少约40%。建议不必调整剂量。用法用量咀嚼片：15岁及15岁以上成人剂量为每日服用顺尔宁一片，每片10mg，睡前服用。6至14岁儿科患者剂量为每日服用顺尔宁咀嚼片1片，每片5mg，睡前服用。该组患者不需要再按年龄调整剂量。6岁以下患儿的安全有效剂量及用法尚未确定。包衣片：15岁及15岁以上成人10mg睡前服用。6至14岁儿科患者5mg睡前服用。注重事项口服顺尔宁治疗急性哮喘发作的疗效尚未确定。所以，口服顺尔宁不应该用于治疗急性哮喘发作。应劝告患者预备好必要的急救药品备用。虽然合用的吸入皮质类固醇制剂可在医师监督下逐渐减量，但不应骤然使用顺尔宁取代吸入或口服皮质类固醇制剂。妊娠和哺乳妇女慎用。对本产品的任何成分过敏者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com