

粉尘螨注射液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E7\\_B2\\_89\\_E5\\_B0\\_98\\_E8\\_9E\\_A8\\_E6\\_c22\\_313339.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_B2_89_E5_B0_98_E8_9E_A8_E6_c22_313339.htm) 药品名称粉尘螨注射液 类别其他抗变态反应药制剂注射液：每支1：10000（1ml）；1：5000（1ml）。药理及应用是由粉尘螨提取的有效抗原，为一种强烈的过敏原，用于脱敏治疗。据认为，其作用机理是通过少量多次地给予过敏原，使人体产生较多的特异性阻断抗体（igg），后者占据了肥大细胞及嗜酸性粒细胞抗体及抗原联接位置，从而产生免疫耐受性，经较长时期的注射给药后可使体内ige减少而脱敏。临床试用于过敏性哮喘有显著疗效，对异位性皮炎的疗效较一般抗组胺药为佳。适用于吸入型哮喘、过敏性鼻炎、异位性皮炎、泛发性湿疹、慢性荨麻疹等。说明系由粉尘螨（*dermatophagoides farinae*）浸出液配制成的无色灭菌水溶液。每ml相当于干尘螨0.1mg或0.2mg，标示浓度为1：10000和1：5000。用法用量皮下注射，成人通常每周1次，15次为一疗程：第1～3周，用1：100000浓度，各周剂量相应为0.3，0.6，1.0ml；第4～6周，用1：10000浓度，各周剂量相应为0.1，0.3，0.6ml；第7～15周，用1：5000浓度，前2周剂量相应为0.3，0.6ml，以后每周1.0ml；如疗程结束时效果明显，可改用维持量，每2周1次，每次1：5000浓度1ml。儿童以25周为一疗程，第1～10周，用1：100000浓度，自0.1ml开始，每周递增0.1ml；第11～20周，用1：10000浓度，自0.1ml开始，每周递增0.1ml；第21～25周，用1：5000浓度，各周剂量相应为0.6，0.7，0.8，0.9，1.0ml，如疗程结束时效果明显，可改用维持量，每2周1次，每次1：5000浓度1ml。注重事项（1）应在医师指导下应用。注射

前应先用1：100000的药液（将1：10000的药液用0.9%氯化钠注射液稀释10倍）0.1ml作皮试，观察半小时，如丘疹反应直径大于10mm，则第一次注射量应比规定剂量适当减少。治疗5～10次后再按上述剂量注射。（2）凡注射后24小时内有局部红肿、皮疹等反应者，下次注射剂量直减半或不增。（3）可见局部红肿、皮疹或稍微哮喘。（4）每次注射后需观察半小时，如发生休克，其处理方法与青霉素休克时相同，因此，使用本品时应配备肾上腺素等救治过敏性休克的药械。（5）停药二周以上再次用药时仍需从小剂量开始，逐渐减量。（6）6岁以下儿童以不用为妥。严重心血管疾患和肾功能严重低下者禁用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)