

美替拉酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BE\\_8E\\_E6\\_9B\\_BF\\_E6\\_8B\\_89\\_E9\\_c22\\_313345.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_BE_8E_E6_9B_BF_E6_8B_89_E9_c22_313345.htm) 药品名称美替拉酮药物别名（甲吡酮，METOPIRONE）英文名称Metyrapone〔〕类别肾上腺皮质激素及促肾上腺皮质激素药理及应用本品为11-羟化酶抑制剂，能抑制皮质醇的产生。如垂体功能正常，服用本品后ACTH分泌增多，后者使肾上腺皮质中皮质醇前体11-去氧皮质醇的合成和释放增加，使尿中17-生酮类固醇排泄增加，11-去氧皮质酮和脱氢异雄酮也增多。适应症本品通常用于库欣综合征的鉴别诊断不良反应不良反应有恶心、呕吐、眩晕，也可引起高血压和低钾性碱中毒。在服用较大剂量时轻易诱发肾上腺皮质功能不全。用法用量每次750mg，每4小时服1次，共6次。儿童15mg / kg 本品也可用于柯兴综合征的治疗。每次0.2g，1日2次。可根据病情调整用量到1次1g，1日4次。常用其胶囊剂，每胶囊250mg。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)