

硫酸锌口服溶液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E9_94_8C_E5_c22_313347.htm 药品名称硫酸锌口服溶液 英文名称Zinc Sulfate Oral Solution 类别电解质平衡调节药制剂口服溶液：。本品为淡黄色或淡黄绿色液体，味香甜，略涩。口服溶液：100ml(浓度1%；含锌量0.23%)。药理毒理本品为补锌药、外用药。锌参与多种酶的合成与激活，对蛋白质、核酸合成、肠道蛋白的吸收和消化发挥重要生理功能。锌能促进生长发育，通过对味蕾中味觉素的合成及防止颊黏膜上皮细胞角化不全，维持正常食欲及味觉，增强吞噬细胞吞噬能力，趋化活力及杀菌功能；并且通过超氧化物歧化酶保持吞噬细胞内自由基水平，自由基能破坏微生物的细胞膜，发挥杀菌作用，加速创伤、烧伤、溃疡的愈合；锌对维生素A的代谢及视觉起重要作用，促进及维持性功能，稳定细胞膜，改善组织能量代谢及组织呼吸；锌离子能沉淀蛋白质。药动学锌在十二指肠与小肠吸收，胃吸收少，入血后绝大部分与血清蛋白结合，主要由粪便排出，微量经尿、汗、皮肤脱屑、毛发脱落排出。适应症锌缺乏引起的食欲缺乏、异食癖、贫血、生长发育迟缓、营养性侏儒及肠病性肢端皮炎；也可用于类风湿性关节炎、间歇性跛行、肝豆状核变性（适用于不能用青霉胺者）、痤疮、慢性溃疡、结膜炎、口疮等的辅助治疗。不良反应本品有胃肠道刺激性，口服可有轻度恶心，呕吐、便秘、服用0.2-2g可催吐；超量服用中毒反应表现如急性胃肠炎、恶心、呕吐、腹痛、腹泻。偶见皮疹、胃肠道出血，罕见肠穿孔。相互作用本品与铝、钙、镉

盐、硼砂、碳酸盐和氢氧化物（碱）、蛋白银和鞣酸等有配伍禁忌。锌盐与青霉胺共用可使后者作用减弱。用法用量成人常用量，治疗量：口服一日300mg（含锌量68mg），分3次服；长期服用剂量可根据血浆锌浓度不高于 $30.6 \mu\text{mol/L}$ 调整。中国营养学会（1981）制定锌生理需要量为：1~6月小儿每日元素锌3mg；7-12月小儿每日元素锌5mg；1-10岁小儿每日元素锌10mg；>10岁-成人每日元素锌15mg；孕妇每日元素锌20mg；乳母每日元素锌25mg可以作为参考制定儿童给药剂量。注重事项消化道溃疡患者禁用。宜餐后服用，以减少胃肠道刺激。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com