

氯化钙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E6_B0_AF_E5_8C_96_E9_92_99_c22_313359.htm 药品名称氯化钙 英文名称calcium chloride 类别电解质平衡调节药性状白色半透明的坚硬碎块或颗粒，极易潮解。无臭，味稍苦。极易溶于水，易溶于乙醇。制剂注射液：每支0.3g（10ml）；0.5g（10ml）；0.6g（20ml）；1g（20ml）。氯化钙葡萄糖注射液：俗简称葡萄糖钙*，为含氯化钙5%及葡萄糖25%的灭菌溶液，用于因血钙降低而致的手足搐搦、荨麻疹、血清反应等，1次量10~20ml，静注，每日或隔日1次。禁用于肌注，以免引起组织坏死。* 注重不要把葡萄糖钙（即葡萄糖氯化钙注射液）和葡萄糖酸钙弄混了，两者不同。葡萄糖酸钙肌注、静注均可，葡萄糖钙（即葡萄糖氯化钙）只能供静注，如肌注会造成组织坏死。痒苦乐民注射液（氯化钙溴化钠注射液）：每支5ml，含氯化钙0.1g，溴化钠0.25g。主要用于皮肤瘙痒症，止痒作用比葡萄糖酸钙针强。每次静注5ml（重症可用10ml），1日1~2次。静注时宜缓慢，以免引起全身发热反应。禁用于肌注。药理及应用正常人含钙总量约1400g，其中99%以骨盐形式存在于骨中以保持骨的硬度。（1）正常人血清钙含量约9~11mg/dl，血钙降低时可出现神经肌肉兴奋性升高，甚至昏迷。本品可用于血钙降低引起的手足搐搦症以及肠绞痛、输尿管绞痛等。（2）能降低毛细血管通透性，增加毛细血管壁的致密性，使渗出减少，有消炎、消肿及抗过敏等作用，可用于荨麻疹、渗出性水肿、瘙痒性皮肤病。（3）与镁离子有竞争性拮抗作用，可解救镁盐中毒。（4）用于防止慢性钙缺乏症，常用于维生素d缺乏性佝偻病、软骨病、

孕妇及哺乳期妇女钙盐补充。用法用量将5%液10~20ml以25%葡萄糖液稀释一倍后缓慢静注。注重事项（1）静注时可有全身发热感。注射宜缓慢（每分钟不超过2ml），因钙盐兴奋心脏，注射过快会使血内浓度忽然增高，引起心律失常，甚至心搏骤停。（2）在应用强心甙期间或停药后7日以内，忌用本品。（3）有强烈刺激性，其5%溶液不可直接静注，应在注射前以等量葡萄糖液稀释。亦不宜作皮注或肌注。（4）注射液不可漏于血管之外，否则导致剧痛及组织坏死。如有外漏，应立即用0.5%普鲁卡因液作局部封闭。

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com