

曲安奈德 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E6_9B_B2_E5_AE_89_E5_A5_88_E5_c22_313369.htm 药品名称曲安奈德药物别名（曲安缩松，去炎舒松，去炎松-A，确炎舒松-A）英文名称Triamcinolone Acetonide 类别肾上腺皮质激素及促肾上腺皮质激素性状常用其醋酸酯，为白色或类白色结晶性粉末；无臭。在氯仿中溶解，在丙酮中略溶，在乙醇中微溶，在水中不溶。制剂注射液：每支5mg（1ml）；110mg（1ml）；50mg（5ml）；200mg（5ml）。气雾剂：每克含药0.147mg。软膏、乳膏、滴眼剂：0.025%；0.1%；0.5%。洗剂：0.025%；分子式成分药理及应用作用与由安西龙相似，其抗炎和抗过敏作用较强且远较持久。肌注后在数小时内生效，经1~2日达最大效应，作用可维持2~3周。适用于各种皮肤病（如神经性皮炎、湿疹、牛皮癣等）、关节痛、支气管哮喘、肩四周炎、腱鞘炎、急性扭伤、慢性腰腿痛及眼科炎症等。用法用量肌注：每周1次，20~100mg。皮下注射或关节腔内注射：用量酌情决定，一般为2.5~5mg。对皮肤病可于皮损部位或分数个部位注射，每处剂量为0.2~0.3mg，每日剂量不超过30mg，每周总量不超过75mg。用前应充分摇匀。外用：用软膏、乳膏、滴眼剂，1日1~4次；气雾剂，1日3~4次。注重事项（1）关节腔内注射可能引起关节损害。（2）长期用于眼都可引起眼内压升高。病毒性、结核性或急性化脓性眼病忌用。（3）孕妇不宜长期使用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com