

尼莫司汀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B0\\_BC\\_E8\\_8E\\_AB\\_E5\\_8F\\_B8\\_E6\\_c22\\_313389.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_B0_BC_E8_8E_AB_E5_8F_B8_E6_c22_313389.htm) 药品名称尼莫司汀药

物别名尼氮芥，嘧啶亚硝脲，宁得朗，NIDRAN，ACNU 英文名称Nimustine〔 〕类别烷化剂性状为白色或黄白色结晶状粉末。易溶于水，遇光易分解。制剂注射用尼莫司汀：每支25mg；50mg。分子式成分药理及应用属亚硝脲类药物，具有烷化作用，能抑制DNA和RNA的合成。可通过血脑屏障。动物实验表明，静注后有7%~16%进入脑脊液，最高可达30%。临床适应证：临床上用于肺癌、胃癌、直肠癌、食管癌和恶性淋巴瘤等，可与其他抗肿瘤药物合并使用。贮存避光保存。用法用量每次剂量为2~3mg/kg或90~100mg/m<sup>2</sup>，以注射用水溶解（5mg/ml），缓慢静注或静滴。6周后可重复使用，总剂量300~500mg。本品还可用于胸腹腔注射、动脉注射和膀胱内给药。注重事项副作用有食欲不振、恶心、呕吐、乏力、发热、皮疹、脱发，对肝功能有一定影响（用药后1~3周氨基转换酶可升高，2~3周后自然恢复），并有迟缓性骨髓抑制。治疗中应观察血象变化以决定用药量。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)