

葵酸诺龙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022_E8_91_B5_E9_85_B8_E8_AF_BA_E9_c22_313398.htm 药品名称葵酸诺龙 英文名称Nandrolone Decanoate 类别雄激素及同化激素制剂注射液：1ml:25mg、1ml:50mg。适应症严重创伤、慢性感染、营养不良等慢性消耗性疾病和各种难治性贫血。不良反应有稍微男性化作用，长期应用可引起黄胆、肝功能障碍及水肿等。用法用量深部肌内注射，难治性贫血，女性成人每隔1~4周给予50mg~100mg，男性成人每隔2~4周给予50mg~200mg，如每隔3~4周给药，应持续用药12周，必要时治疗结束4周后进行第二疗程；严重创伤、慢性感染、营养不良等慢性消耗性疾病，成人每隔1~4周给予50mg~100mg。小儿，2岁~13岁每隔3~4周给予25mg~50mg；2岁以下剂量未定。注意事项治疗贫血时应保证充足的铁质摄入，利用蛋白同化作用治疗时需摄入充足的热量和蛋白质。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com