

甘草酸二铵 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E7\\_94\\_98\\_E8\\_8D\\_89\\_E9\\_85\\_B8\\_E4\\_c22\\_313431.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_94_98_E8_8D_89_E9_85_B8_E4_c22_313431.htm) 药品名称甘草酸二铵  
药物别名甘利欣、肝利欣 英文名称Diammonium

Glycyrrhizinate 类别治疗肝炎辅助用药制剂注射液：10ml

：50mg。 药理毒理本品具有较强的抗炎、保护有细胞及改善肝功能的作用。药理实验证实，小鼠口服本品能减轻因四氯化碳、硫代乙酰胺和D-氨基半乳糖引起的血清谷丙转氨酶及谷草转氨酶升高。本品还能明显减轻D-氨基半乳糖对肝脏的形态损伤和改善免疫性因子对肝脏形态的慢性损伤。药动学静注后主要分布于肺、肝、肾，PB约92%，主要经胆汁分泌，MRT为8h。本品静脉注射后约有92%以上的药物与血浆蛋白结合，平均滞留时间为8小时；在体内以肺、肝、肾分布最高，其他组织脾、心、胃、小肠、睾丸、脑等分布很低，本品静脉注射后主要通过胆汁从粪中排出，部分从呼吸道以CO<sub>2</sub>排出，尿中排出为少量。适应症伴有谷丙转氨酶升高的慢性迁延性肝炎、慢性活动性肝炎。不良反应可有血压升高、头痛、头晕、恶心、腹上区不适、腹胀、皮疹和发热等。相互作用与排钾利尿药合用易致低血钾。用法用量静脉滴注：150mg/次，1次/日注重事项孕妇、婴幼儿禁用。严重低钾血症、高钠血症、心力衰竭、肾功能衰竭者禁用。应监测血压和血钾、钠的含量。本品严禁未经稀释静脉注射。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)