

肝胆能 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E8_82_9D_E8_83_86_E8_83_BD_c22_313451.htm 药品名称肝胆能药物别名galle-donau 类别治疗肝炎辅助用药制剂片剂：每片含对-甲基苯甲醇烟酸酯37.5mg及。 -萘乙酸75mg。药理及应用本品为复方制剂，由对-甲基苯甲醇（p-tolymethylcarbinol）烟酸酯-5 -萘乙酸（-naphthylacetic acid）组成。对-甲基苯甲醇烟酸酯为一种油状液体，具有促进胆汁分泌和护肝作用。狗口服100mg / kg，胆汁即刻迅速分泌，60分钟达峰值，120分钟胆色素达峰值。动物实验表明，可抑制酒精中毒引起的肝细胞破坏。 -萘乙酸为一种有机弱酸，具有促进胆汁分泌、抗炎及护肝作用，其利胆效应具有作用强、持续时间长及胆汁、胆色素和胆酸分泌成比例增加（真性生理胆汁分泌）的特点；用药180分钟达血峰值，持续220~240分钟。在动物实验中可使肝内脂肪经血转运到肝外脂肪库内，对酒精中毒所致的肝细胞破坏有明显的抑制作用。本品中两药经动物和临床实验得出了1：2最佳配伍剂量，可在促进胆汁分泌、护肝和抗炎等方面显示出最强的协同作用。本品中含有酯化的烟酸，可缓解伴有炎症过程的胆道痉挛所致的疼痛。本品可用于整个胆管系统的急性、亚急性和慢性炎症性疾病，以及各种阻断了肝脏胆汁分泌的疾病，如肝炎、胆管炎、胆囊炎、胆石症、胆汁性绞痛、胆汁阻滞及黄疸等；亦可用于预防胆汁分泌功能不良患者进食大量脂肪性食物后引致的消化不良性疼痛；用于x线造影时可提高胆囊和胆管的显影率。用法用量饭前30分钟服1~2片，每日3次。用于胆管造影时，在注射前、注射后20分钟及50分钟各服5片；用于口服造影剂的胆

管造影时，按每小时服用造影剂的间隔时间，每次同服本品2片，即总量为12~14片。注重事项严重肝功能不良、胆管阻塞、胆翼气肿及肝昏迷患者禁用；肾功能不良者慎用。本品副作用较少，患者有较好的耐受性。主要不良反应有轻度腹泻、便秘、一过性alt升高。本品长期服用可能对肾功能有一定影响，因此长期服药应做肾功能监测。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com