

美沙拉秦 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_BE_8E_E6_B2_99_E6_8B_89_E7_c22_313465.htm 药品名称美沙拉秦药

物别名5-氨基水杨酸、美沙拉嗪、艾迪莎、美沙拉嗪

5-Aminosalicylic Acid，5-ASA、ETIASA、mesalamine 英文名

称Mesalazine 类别其他制剂缓释片剂：0.4g；栓剂：1g；混悬

剂（灌肠用）：60ml：4g。分子式成分美沙拉秦 Mesalazine药

理毒理通过在肠道粘膜（小肠、结肠、直肠）缓慢、持续释

放5-氨基水杨酸，达到抗炎作用。药动学口服后药物在通

过肠道时缓慢释放，使回肠末端及结肠内达到有效浓度。直

肠吸收小于15%，T_{max}约4~7h，在肝脏乙酰化代谢。T_{1/2}

为0.5~1.5h。适应症溃疡性结肠炎、直肠乙状结肠炎和直肠

炎。不良反应常见头痛、腹痛、腹泻、恶心等，少数有脱发

等现象。用法用量口服，1.2g~2.4g/日，3次/日。灌肠，睡

前60ml，保持过夜。栓剂塞肛：1粒/次，12次/日。注重事项

本品在肠道内释放，不宜与乳果糖以及能使pH值降低的药物

同服。孕妇、哺乳妇女、肾功能不全者、老年人慎用。对水

杨酸类药物过敏和2岁以下儿童忌用。100Test 下载频道开通

，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com