

洛莫司汀〔典〕〔基〕PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B4\\_9B\\_E8\\_8E\\_AB\\_E5\\_8F\\_B8\\_E6\\_c22\\_313497.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E6_B4_9B_E8_8E_AB_E5_8F_B8_E6_c22_313497.htm) 药品名称洛莫司汀〔典〕〔基〕药物别名环己亚硝脲，CCNU 英文名称Lomustine 类别烷化剂性状淡黄色结晶性粉末，无臭。几不溶于水，溶于乙醇，易溶于氯仿。遇热不稳定。熔点为88~91℃。制剂回胶囊剂：每胶囊40mg，100mg。分子式成分药理及应用作用原理与卡氮芥相近，能口服，主要用于脑肿瘤及小细胞和非小细胞肺癌。口服后吸收很快，在生理条件下 $t_{1/2}$ 为53分钟，迅速转化为代谢物。血浆中氯乙基半衰期为72小时，环己基为5小时，60%以上在48小时内以代谢物形式由尿中排出。本品能透过血脑屏障，脑脊液中的浓度为血浆的50%~55%。临床适应证：临床主要用于脑瘤、恶性淋巴瘤、肺癌及恶性黑色素瘤。贮存置冰箱密闭、避光保存。运送时需装在冰盒中。用法用量口服，1次120~140mg/m<sup>2</sup>，每6~8周口服1次。注重事项不良反应与卡氮芥相同，主要是消化道反应及迟发的骨髓抑制。用药期间应严格检查血象。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)