

异芳芥 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BC\\_82\\_E8\\_8A\\_B3\\_E8\\_8A\\_A5\\_c22\\_313503.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_BC_82_E8_8A_B3_E8_8A_A5_c22_313503.htm) 药品名称异芳芥 英文名称

称Betamerphalan 类别烷化剂制剂本品为糖衣片，除去糖衣后显类白色。25mg分子式成分化学名：对-[双-( -氯乙基)胺基]- -苯丙氨酸。分子式：C<sub>13</sub>H<sub>18</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>。分子量

：305.20。药理毒理为溶肉瘤素的异构体，但毒性较低，等剂量时，疗效可能高于溶肉瘤素。本品为我国研制的抗肿瘤药物。与氮芥比较，疗效较好而毒性较低。为细胞非特异性药物，但对前期和中期细胞的作用更为明显。药动学口服后吸收较慢，6小时后血浆中浓度达最高峰。静脉注射后在血中维持时间较长，24小时排出53%，主要经尿排出，少量从粪便中排出。适应症对慢性粒细胞白血病，睾丸精原细胞瘤有较好的疗效。对恶性淋巴瘤，乳腺癌等有效。对因骨转移的疼痛有止痛作用。不良反应主要为骨髓抑制，白细胞降低及胃肠道反应。相互作用服用本品同碳酸氢钠，可减轻胃肠道反应。用法用量口服：每次25mg，每日一次。用于慢性粒细胞白血病，视病情及血象酌情每日25mg~75mg，维持量每次12.5mg，每周1~3次。注意事项用药期间应严格检查血象。不可超量长期服用。恶液质、有出血倾向和白细胞降低禁用或慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)