

十一酸睾酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8D_81_E4_B8_80_E9_85_B8_E7_c22_313511.htm 药品名称十一酸睾酮
药物别名（安雄，Pantestone，TU）英文名

称TestosteroneUndecanoate〔 〕类别雄激素及同化激素性状
为白色结晶或结晶性粉末；无臭。在氯仿或苯中极易溶解，
在乙醇中溶解，在植物油中略溶，在水中不溶。熔点为60
~ 63 。制剂胶囊剂：每胶囊40mg。注射液：每支250mg
（2ml）。复方睾酮酯注射液：1ml，含十一酸睾酮150mg、
丙酸睾酮20mg、戊酸睾酮80mg。分子式成分药理及应用作用
同睾酮，为肌注长效雄激素，作用维持约70天。口服吸收迅
速，经4~5小时血浓度达峰值，但经肠壁及肝脏大部分被首
过代谢，生物利用度较低；肌注则可避免首过消除。临床适
用于男子性功能减低、再生障碍性贫血等。本品与丙酸睾酮
、戊酸睾酮组成复方睾酮酯（Triolandren）具有协同作用，
肌注作用可维持约4周。临床用于男性雄激素缺乏症：睾丸切
除术后、性功能低下、生殖器功能不足、更年期；女子进行
性乳腺癌及再生障碍性贫血。用法用量口服：1次40mg，每
日3次。肌注：用于男子性功能减低，每月1次250mg，连续4
个月。用于再生障碍性贫血，首次1g，以后每次500mg，1个
月2次。复方睾酮酯（Triolandren）用于睾丸切除术后及更年
期，肌注1次50~100mg，每2~4周1次，连续6~8周。对性功
能低下，1次肌注100mg，1周后再注50mg，然后每2~4
周50mg。注重事项可有粉刺、男子乳房发育、水肿、精子发
生减少等。前列腺癌、肝、肾功能不全、孕妇及哺乳妇忌用
。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

