

司坦唑醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8F_B8_E5_9D_A6_E5_94_91_E9_c22_313523.htm 药品名称司坦唑醇药物别名吡唑甲氢龙，康力龙，Androstanazole，Terabolin 英文名称Stanozolol 类别雄激素及同化激素性状白色结晶性粉末；无臭。在乙醇、氯仿中略溶，在醋酸乙酯或丙酮中微溶，在苯中极微溶解，在甲醇或水中几乎不溶。制剂片剂：每片2mg。分子式成分药理及应用蛋白同化作用较强，为甲睾酮的30倍，雄激素活性为后者的1/4，分化指数为120。具有促进蛋白质合成、抑制蛋白质异生、降低血胆固醇和甘油三酯、促使钙磷沉积和减轻骨髓抑制等作用，能使体力增强、食欲增进、体重增加，而男性化副作用甚微。临床用于慢性消耗性疾病、重病及手术后体弱消瘦、年老体弱、骨质疏松症、小儿发育不良、再生障碍性贫血、白细胞减少症、血小板减少症、高脂血症等。还用于防治长期使用皮质激素引起的肾上腺皮质机能减退。用法用量口服：1次2mg，1日6mg。儿童每日1~4mg，1~3次分服。注重事项（1）服药初期，下肢、颜面可能出现浮肿，继续用药能自行消失。（2）长期使用可有肝功能障碍、黄疸等。（3）严重肝病、心脏病、前列腺肥大、前列腺癌患者及孕妇禁用。（4）如出现痤疮等男性化反应，应停药。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com