

达那唑胶囊 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E8_BE_BE_E9_82_A3_E5_94_91_E8_c22_313540.htm

药品名称达那唑胶囊
药物别名Danacrin 英文名称Danazol 类别雄激素及同化激素制剂
剂型：100mg、200mg。分子式成分化学名为：17 β -孕甾-2,4-二烯-20-炔并[2,3-d]异唑-17 β -醇。分子式

：C₂₂H₃₇NO₂。分子量：337.46 药理及应用性激素对抗药。具有选择性抑制促性腺激素分泌；抑制甾体激素的生物合成，可轻度的抑制雌二醇和黄体酮的水平。是促性腺激素抑制药，可以抑制垂体-卵巢轴。由于抑制了垂体促性腺激素，故促卵泡激素（FSH）和促黄体生成激素（LH）的释放均减少。能直接抑制卵巢的甾体激素的生成，作用于子宫内膜细胞的雌激素受体部位，有抑制雌激素的效能，使子宫正常的和异常的内膜萎缩和不活动，导致不排卵及闭经，可持续达6-8个月之久。治疗纤维性乳腺病，可使结节消失，减轻疼痛和触痛，可能发生月经失调或闭经。治疗遗传性血管性水肿时，增加血清的C1脂酶抑制物的水平，导致补体系统的C4血清内的浓度升高。药动学口服易吸收，在肝内代谢，经肾脏排泄。T_{1/2}约为4.5h。本品口服易从胃肠道吸收，T_{1/2}约为4.5小时。每次给药100mg，每日2次，血药浓度峰值为200-800ng/ml。若每次给药200mg，每日2次，连服14日，血药浓度达0.252ug/ml。在肝内代谢，从肾脏排泄，其代谢物为 α -羟甲基乙炔睾酮和乙炔睾酮。适应症子宫内膜异位症及纤维囊性乳腺病、自发性血小板减少性紫癜、遗传性血管性水肿、系统性红斑狼疮、男子乳房女性化、青春期性早熟及不孕症等。不良反应常见闭经、突破性子宫出血和滴血、乳

房缩小、粉刺、皮肤或毛发的油脂增多、下肢浮肿等，偶见血尿、牙龈出血、白内障、肝功能损害、颅内压增高等，罕见女性阴蒂增大、男性睾丸缩小、巩膜或皮肤黄染等，非凡应注重的不良反应是肌痉挛性疼痛、潮红或皮肤发红、神经质或多汗、阴道灼热等。

1.较多见的不良反应：闭经，突破性子宫出血，并可有乳房缩小、音哑、毛发增多；可出现痤疮、皮肤或毛发的油脂增多、下肢浮肿或体重增多，症状与药量有关，是雄激素效应的表现。

2.较少见的不良反应：血尿、鼻衄、牙龈出血、白内障（视力逐渐模糊）、肝功能异常、颅内压增高（表现为严重头痛、视力减退、复视、呕吐）、白细胞增多症、急性胰腺炎、多发性神经炎等。

3.罕见的不良反应有：女性阴蒂增大、男性睾丸缩小；肝脏功能损害严重时，男女均可出现巩膜或皮肤黄染。

4.以下反应假如持续出现需引起注重：（1）由于雌激素效能低下，可使妇女有阴道灼热、干枯及瘙痒，或阴道出血。（2）可出现皮肤发红、情绪或精神状态的改变、神经质或多汗。（3）有时可出现肌痉挛性疼痛，属于肌肉中毒症状。

相互作用与华法林并用时抗凝增效，易发生出血。（1）与胰岛素同用时，轻易产生耐药性；（2）与华法林并用时抗凝增效，轻易发生出血。

用法用量口服，成人，子宫内膜异位症400mg~800mg/日，分次服，于月经来潮的第一日开始服药，连服3~6个月，必要时可持续到9个月，如症状再出现，可再用药一疗程；纤维囊性乳腺病50mg~200mg/次，2次/日，于月经来潮的第一日开始服药，如停药一年内症状复发，可再给药；遗传性血管性水肿开始200mg/次，2~3次/日，直至疗效出现，在1~3个月或更长的间隔时间递减，维持量是开始量

的50%或更少。注重事项治疗期间一旦发现妊娠，应立即停药。哺乳期妇女禁用。青年患者宜每3~4个月查一次精液量及粘度、精子计数与活动力，并注重睾丸大小。女性患者假如出现男性化症状，应停药。心、肝、肾功能损害者慎用。血栓症患者、心肝肾疾患者、异常性生殖器出血患者禁用。（1）癫痫、偏头痛、糖尿病患者慎用。（2）治疗期间注重肝功能检查。男性用药时，需检查精液量、粘度、精子数和活动力，每3-4月检查一次，非凡是青年患者。（3）女性开始时，应采取工具避孕，防止妊娠；一旦发生妊娠，立即停药并终止妊娠。（4）服药期间对一些诊断性实验有影响。如糖耐量试验、甲状腺功能试验、血清总T4可降低而血清T3则可增加。（5）使用本品时应注重有无心脏功能损害、肾脏功能损害、生殖器官出血及肝脏功能损害，对男性应注重睾丸大小。（6）出现男性化症状，应停止治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com