

吲哚布芬 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_90_B2_E5_93_9A_E5_B8_83_E8_c22_313541.htm 药品名称吲哚布芬 英文名称Indobufen [] 类别抗血小板药物制剂片剂：每片200mg。注射液：每支200mg（2ml）。分子式成分 药理及应用本品可抑制引起血小板激活的一些因子（如ADP、5-HT、血小板因子4、 α -血小板球蛋白等）的释放以及影响花生四烯酸代谢而抗血小板聚集，但不影响PGI₂的血浓度。对血液凝固的各种参数无影响，但能中等度地延长出血时间，停药后即可恢复。口服后吸收迅速，血浆浓度达峰时间2小时；t_{1/2}为8小时；与血浆蛋白结合率为99%。用于动脉硬化所致的缺血性心、脑血管和四周血管疾病，静脉血栓形成、血脂代谢障碍等；也可用于体外循环手术时防止血栓形成。用法用量每日剂量200~400mg，分2次口服或肌注或静注。老人及肾功能不全者宜减半。注重事项偶有上腹不适、腹胀、胃肠道出血和鼻衄。有时出现过敏反应（荨麻疹）。禁用于有出血性疾病、妊娠及哺乳妇。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com