

二甲硅油〔典〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E4_BA_8C_E7_94_B2_E7_A1_85_E6_c22_313547.htm

药品名称二甲硅油〔典〕 英文名称dimethicone 类别其他性状无色澄清的油状液体；无臭或几乎无臭，无味。在氯仿、乙醚、苯、甲苯或二甲苯中能任意混合，在水或乙醇中不溶。制剂片剂；每片含二甲硅油25mg或50mg，另含氢氧化铝40mg或80mg为分散剂。

二甲硅油气雾剂：每瓶总量18g，内含二甲硅油0.15g，此外尚含适量薄荷脑及抛射剂氟里昂（f12）。二甲硅油散：含二甲硅油6%，为抗泡沫药，可使胃肠内泡沫破灭，提高胃肠检查和放射检查的清楚度。用于胃镜检查时，在喷用麻醉剂前，

口服或管注本品0.5%～1.0%的水悬液30～50ml，半小时内完成镜检。胃肠气钡双重对比检查；服用产气粉后，服用含本品0.2%～0.4%的硫酸钡混悬液，服后2～5分钟完成摄片。结肠气钡双对比灌肠：在硫酸钡混悬液中按0.2%～0.4%加入本品，进行双重造影法灌肠，当气钡充盈全结肠后摄片。注重：

本品的的水悬液应新鲜配制，3天内用完。药理及应用本品为排气剂，由于表面张力小，能消除胃肠道中的泡沫，使被泡沫贮留的气体得以排除，从而缓解胀气。可用于各种原因引起的胃肠道胀气，有明显效果，多于服药后1小时左右见效。但对非气性胃肠道膨胀感（如消化不良等）无效。又能消除急性肺水肿时深呼吸道以至肺泡内的泡沫，改善患者因泡沫形成而产生的缺氧状态，用于各种原因引起的急性肺水肿的抢救。亦用于胃镜检查。贮存气雾剂应密闭，在凉暗处保存。

温度高于42℃时易胀裂。用法用量（1）消胀气：1次0.1

~ 0.2g，1日3次，嚼碎服。（2）抢救急性肺水肿：使用气雾剂，用时将瓶倒置，距患者口鼻约15cm处，揿压瓶帽，在吸气时（或呼气终末时）连续喷入或与给氧同时进行，直至泡沫减少、症状改善为止。必要时可反复使用。【注重】其气雾剂瓶外防护套为防胀裂用，切勿撕下。温度过低不能喷雾时，应微加温后使用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com