

甲睾酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E7\\_94\\_B2\\_E7\\_9D\\_BE\\_E9\\_85\\_AE\\_c22\\_313549.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_94_B2_E7_9D_BE_E9_85_AE_c22_313549.htm) 药品名称甲睾酮药物别名（甲基睾丸素，Android）英文名称Methyltestosterone 类别雄激素及同化激素性状白色或类白色结晶性粉末；无臭，无味；微有引湿性。在乙醇、丙酮或氯仿中易溶，在乙醚中略溶，在植物油中溶解，在水中不溶。熔点163~167℃。制剂片剂：每片5mg；10mg。分子式成分药理及应用作用与天然睾酮相同，但口服有效，能促进男性性器官及副性征的发育、成熟；对抗雌激素，抑制子宫内膜生长及卵巢、垂体功能；促进蛋白质合成及骨质形成；刺激骨髓造血功能，使红细胞和血红蛋白增加。口服能从胃肠道吸收，经1~2小时血浓度达峰值， $t_{1/2}$ 2.7小时；也可从口腔粘膜吸收。由于口服经肝脏代谢失活，故以舌下含服为宜，剂量可减半。临床用于男性性腺机能减退症、无睾症及隐睾症；妇科疾病，如月经过多、子宫肌瘤、子宫内膜异位症；老年性骨质疏松症及小儿再生障碍性贫血等。用法用量口服或舌下含服：1次5~10mg，1日10~30mg。（1）男性雄激素缺乏症 开始时每日30~100mg，维持量为1日20~60mg。（2）月经过多或子宫肌瘤 每次舌下含服5~10mg，1日2次，每月剂量不可超过300mg。（3）子宫内膜异位症 每次舌下含服5~10mg，1日2次，连用3~6个月。（4）老年性骨质疏松症 每日10mg，舌下含服。（5）小儿再生障碍性贫血 每日1~2mg/kg，1~2次分服。（6）用于晚期乳腺癌 1日50~200mg，分次服用。注重事项大剂量（每月300mg以上）可引起女性男性化、浮肿、肝损害、黄疸、头晕、痤疮等。有过敏反应者应停药。肝功能不

全者慎用。前列腺癌患者、孕妇及哺乳期妇女禁用。 100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)