

依前列醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E4_BE_9D_E5_89_8D_E5_88_97_E9_c22_313552.htm 药品名称依前列醇 英文名称Epoprostenol [] 类别抗血小板药物制剂注射用依前列醇钠：每支500 μg（附甘氨酸缓冲液50ml）。药理及应用本品具有抗血小板和舒张血管作用，故可防止血栓形成。前者的作用机制可能在于激活腺苷酸环化酶，而使血小板内cAMP浓度上升所致。本品性不稳定，在体内迅速分解为6-酮-PGF₁，t_{1/2}为2~3分钟，其代谢物较稳定，但生物活性极弱。主要用于治疗某些心血管疾病（如心肺分流术、血液透析等）时作为抗血小板药以防止高凝状态。也用于严重外周血管性疾病（如雷诺病）、缺血性心脏病、原发性肺动脉高压和血小板消耗性疾病等。用法用量静滴，每分钟5ng/kg，临用时配制，连续滴注时间根据病情而定。注重事项常见的不良反应有低血压、心率加速、面部潮红、头痛等，其发生率随剂量加大而增多。也可有胃痉挛、恶心、呕吐、胃部不适、血糖升高、嗜睡、胸痛等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com