

羟甲烯龙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_BE_9F_E7_94_B2_E7_83_AF_E9_c22_313553.htm 药品名称羟甲烯龙药物别名（康复龙，羟次甲氢龙，Anadrol，Hydroxymetholone）英文名称Oxymetholone 类别雄激素及同化激素性状白色或乳白色结晶性粉末，无臭，熔点174~182℃。不溶于水，易溶于氯仿，溶于二氧六环、植物油，略溶于乙醇、乙醚。制剂片剂：每片2.5mg。分子式成分药理及应用蛋白同化作用为甲睾酮的4倍，雄激素活性为后者的0.39倍，分化指数约10.5。能促进蛋白质合成和抑制蛋白质异生，并能降低血胆固醇、减少钙磷排泄和减轻骨髓抑制，促进发育，促进组织新生和肉芽形成。对肾上腺皮质激素长期使用引起的肾上腺皮质功能减退有预防及对抗作用。临床用于慢性消耗性疾病、年老体弱、重病及术后体弱消瘦、小儿发育不全、骨质疏松症、再生障碍性贫血、白细胞减少症、高脂血症等。用法用量口服：1日5~10mg，分1~3次服用。儿童用量每日1.25~5mg。对再生障碍性贫血，每日1~5mg/kg。骨质疏松症，1次2.5mg，1日3次，可达每日20mg。注重事项（1）可有恶心、水肿、肝功能障碍及黄疸等。青年妇女偶有月经推迟现象，停药可恢复。（2）儿童用药不要超过30天，成人不超过90天，停药休息后可再用。对再生障碍性贫血，用药时间可较长。（3）肝、肾功能不全、前列腺癌患者及孕妇忌用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com