

双嘧达莫 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8F_8C_E5_98_A7_E8_BE_BE_E8_c22_313569.htm 药品名称双嘧达莫
英文名称Dipyridamole 类别抗血小板药物制剂片剂：每片25mg
药理及应用具有抗血栓形成作用。它可抑制血小板的第一相聚集和第二相聚集。高浓度时（ $50\mu\text{g}/\text{ml}$ ）可抑制血小板的释放反应。其作用机制可能在于抑制血小板中磷酸二酯酶的活性，也有可能是通过增强内源性PGI₂而发生作用的，因此它只有在人体内存在PGI₂时才有效；而当PGI₂缺乏或应用了过大剂量的阿司匹林则无效。具有抗血栓形成作用。对出血时间无影响。口服后吸收迅速，血浆半衰期为2~3小时。用于血栓栓塞性疾病及缺血性心脏病。用法用量单独应用疗效不及与阿司匹林合用者。单独应用时，每日口服3次，每次25~100mg；与阿司匹林合用时其剂量可减少至每日100~200mg。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com