

克栓酶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_85_8B_E6_A0_93_E9_85_B6_c22_313582.htm 药品名称克栓酶药物别名巴曲酶、东菱迪芙、东菱精纯抗栓酶、东菱克栓酶 Batroxobin，DF-521 英文名称Defibrin 类别其他造血系统药制剂注射液：1ml：10BU，0.5ml：5BU。避光、5℃以下保存（但应避免冻结）。药理毒理增强纤溶系统活性，改善流变学方面的诸因素，以及减少血栓形成基质等作用。使溶栓作用快速，缺血部位功能恢复，达到治疗和防止复发的效果。药动学主要分布于肝、肾、血液中，大部分经肾脏排泄，T_{1/2}约2.8~5.9h。适应症急性缺血性脑病，突发性耳聋、动脉闭塞症等。不良反应出血倾向，头痛、头晕等，偶有转氨酶升高。相互作用水杨酸类药、抗凝药等可加剧本品作用。用法用量静滴，成人，首剂，10BU~20BU，维持量5BU，隔日一次，一般1周为一疗程。注重事项妊娠、哺乳期妇女禁用。消化道溃疡、脑血管后遗症、老年患者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com