

去氢甲睾酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8E\\_BB\\_E6\\_B0\\_A2\\_E7\\_94\\_B2\\_E7\\_c22\\_313583.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8E_BB_E6_B0_A2_E7_94_B2_E7_c22_313583.htm) 药品名称去氢甲睾酮  
药物别名（去氢甲基睾丸素，甲睾烯龙，大力补，Danabol，Dianabol，Metanabol）英文名称Metandienone 类别雄激素及同化激素性状白色或微黄色结晶性粉末，无臭，熔点163~167。不溶于水，溶于乙醇、氯仿，微溶于乙醚。制剂片剂：每片1mg；2.5mg；5mg。分子式成分药理及应用为甲睾酮的去氢衍生物，但雄激素作用较小，蛋白同化作用较强。其蛋白同化作用与丙酸睾酮相同，雄激素活性约为后者的1/100，分化指数为3。能促进蛋白质合成，抑制蛋白质异生，维持正氮平衡，使食欲增进、肌肉增长、体重增加。促进钙磷在骨组织中沉积，促进骨细胞间质形成，加速骨钙化和骨生长。促进组织新生和肉芽形成，加速创伤和溃疡的修复。降低血胆固醇，改善脂质代谢。临床用于慢性消耗性疾病、骨质疏松症、严重感染和创伤烧伤等引起的负氮平衡，促进早产儿及未成熟儿的生长等。对骨折不易愈合、高胆固醇血症、产后衰弱等亦可使用。用法用量口服：成人开始时1日10~30mg，2~3次分服；病情得到控制后改为维持量，每日5~10mg，连用4~8周为一疗程，重复疗程时应间隔1~2月。老人用量宜酌减。乳幼儿每日0.05mg/kg。注重事项（1）可有恶心、呕吐、消化不良、腹泻等。长期大量使用可致水钠潴留、水肿、黄疸、肝功能障碍等；对女性患者可有稍微男性化反应，如痤疮、多毛症、声音变粗、阴蒂肥大等。（2）肝病、肾病、高血压、前列腺癌患者及孕妇忌用。（3）为提高疗效，宜同时服用适量蛋白质、糖和维生素

素等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细  
请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)