

卡莫氟 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8D_A1_E8_8E_AB_E6_B0_9F_c22_313595.htm 药品名称卡莫氟药物别名氟己嘧啶，己胺酰氟尿嘧啶，氟尿己胺、嘧福禄 Mifurool，HCFU 英文名称Carmofur 类别抗代谢药制剂片剂：50mg、250mg。本品为白色片。分子式成分化学英文名：5-fluoro-N-hexyl-3, 4-dihydro-2, 4-dioxo-1(2H)-pyrimidinecarboxamide。中文名：1-己胺基甲酰-5-氟-2, 4(1H, 3H)-嘧啶二酮。分子式：C₁₁H₁₆FN₃O₃。分子量：257.26。药理毒理本品为嘧啶类的氟化物，属于抗代谢抗肿瘤药，能抑制胸腺嘧啶核苷酸合成酶，阻断脱氧嘧啶核苷酸转换成胸腺嘧啶核苷核，干扰DNA合成。对RNA的合成也有一定的抑制作用。药动学口服吸收快而较完全，T_{max}约2h~4h，体内转化为氟尿嘧啶，分布于血浆、淋巴液、腹水和组织液中。适应症胃癌、结肠癌、直肠癌等胃肠道恶性肿瘤及乳腺癌等。不良反应血液系统偶见白细胞、血小板减少。神经系统偶见言语、步行及意识障碍、椎体外系反应等。消化道反应有恶心、呕吐、腹痛、腹泻，罕见消化道溃疡。肝肾功能异常，有时出现胸痛、ECG异常。其它有皮疹、发热、水肿等。相互作用尚不明确。用法用量口服，每日按体重12mg~18mg/kg，分2次~4次服，最大量900mg/日。注重事项忌饮酒。妊娠D类，孕妇、哺乳期妇女禁用。肝肾功能异常、年老体弱者慎用。代谢物氟代柠檬酸具神经毒性，可致脑瘫。静脉滴注速度应缓慢，连用2周~4周后休息2周作为一疗程。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com