

氯烯雌醚 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E6_B0_AF_E7_83_AF_E9_9B_8C_E9_c22_313618.htm 药品名称氯烯雌醚药物别名（泰舒，TACE，Chlorotrisin）英文名

称Chloritrianisene 类别雌激素及其类似合成药物性状白色或类白色结晶或结晶性粉末；无臭。在氯仿、苯或丙酮中易溶，在乙醚中溶解，在甲醇或乙醇中微溶，在水中几乎不溶。熔点为114～120。制剂滴丸剂：每粒4mg。分子式成分药理及应用雌激素活性比己烯雌酚弱，约为后者的1/10，但作用较持久，耐受性较好。口服吸收后贮存于体内脂肪中，并缓慢释放。滴丸剂在胃中分布均匀，吸收快，效果较好。实验证实，大鼠口服5mg，第10天粪便中还能测出；猴口服70mg，第30天尚有6%～18%雌激素活性物质。经肝代谢后主要从粪便中排泄。临床主要用于绝经期综合征、妇女手术后缺乏雌激素引起的症状及前列腺肥大等。用法用量（1）妇女更年期综合征：每日4～12mg，分2～3次服用，20～22天为一疗程，停药5～6天后；再开始第二个疗程。（2）青春期功能性子宫出血：每日20～80mg，2～3次分服，止血后酌情递减，每日维持量8mg。（3）妇女性腺功能不全：每日8～12mg，分2～3次服用，21日为一疗程，停药7日后再开始下一疗程。（4）前列腺肥大：每日12～24mg，2～3次分服，4～8周为一疗程，必要时可延长或遵医嘱。注重事项偶有稍微胃部不适、恶心、头痛、乳房胀痛等，大多数在继续用药中自行好转。孕妇、乳腺癌及诊断未明的妇科出血患者禁用。有血栓史患者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com