

磺巯嘌呤钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_A3_BA_E5_B7_AF_E5_98_8C_E5_c22_313629.htm 药品名称磺巯嘌呤钠
英文名称Sulfomercaprin Sodium 类别抗代谢药制剂注射剂

: 0.2g、0.4g。片剂。分子式成分化学名：6-巯基嘌呤钠-S-磺酸钠。分子式： $C_5H_2N_4Na_2O_3S_2 \cdot 2H_2O$ 。分子量：312.23。本品为白色鳞片状结晶。适应症急性粒细胞及淋巴细胞白血病，绒毛膜上皮癌及恶性葡萄胎等。不良反应1、胃肠道反应可见恶心、呕吐、口腔粘膜炎症；2、骨髓抑制表现为血小板和白细胞减少，但较巯嘌呤缓和；3、有肝功能损伤者可出现黄疸；4、敏感病人可有血尿酸过高，尿酸结晶及肾功能障碍。相互作用尚不明确。用法用量1、白血病：成人用量，静注或肌肉注射一次4mg ~ 5mg/kg，一日1次或溶于5%葡萄糖中静滴，一日1次，10 ~ 14日一疗程；2、绒毛膜上皮癌，恶性葡萄胎：静滴一次8mg ~ 10mg/kg，一日1次，10日为一疗程；3、脑膜白血病：成人用量，鞘内注射一次100mg ~ 200mg，隔日一次，5次为一疗程。注重事项已知对本品高度过敏的患者禁用。#093.尚不明确。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com