

苯甲酸雌二醇注射液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E8_8B_AF_E7_94_B2_E9_85_B8_E9_c22_313668.htm

药品名称苯甲酸雌二醇注射液 英文名称Estradiol Benzoate Injection 类别雌激素及其类似合成药物制剂本品为淡黄色的澄明油状液体。1ml:1mg、1ml:2mg 分子式成分化学名为: 3-羟基雌甾-1,3,5(10)-三烯-17-醇-3-苯甲酸酯。分子式: C₂₅H₂₈O₃。分子量

: 376.50 药理毒理雌激素类药。可使子宫内膜增生、增强子宫平滑肌收缩，促使乳腺发育增生。大剂量抑制催乳素释放，对抗雄激素作用，并能增加钙在骨中沉着。药动学在血液内，部分与B-球蛋白结合，游离的雌二醇被组织利用。部分被肝脏破坏，或经胆汁排泄，再被肠道吸收，形成肠肝循环，其代谢产物多与硫酸或葡萄糖醛酸结合成酯后从尿中排出。适应症补充雌激素不足，如萎缩性阴道炎、女性性腺的功能不良、外阴干枯症、绝经期血管舒缩症状、卵巢切除、原发卵巢衰竭等。晚期前列腺癌（乳腺癌、卵巢癌患者禁用）。与孕激素类药物合用，能抑制排卵。闭经、月经异常、功能性子宫出血、子宫发育不良。不良反应可有恶心、头痛、乳房胀痛，偶有血栓症、皮疹、水钠潴留等。相互作用与降糖药合并使用时，可能减弱其降糖作用，应调节剂量。用法用量1.用于绝经期综合症，肌注一次1-2mg，一周2-3次。2.子宫发育不良，一次1-2mg，每2-3日肌注一次。3.功能性子宫出血，每日肌注1mg-2mg，至血净后酌情减量，后期择日用黄体酮撤退。4.退奶，每日肌注2mg，不超过3天后减量或改小量口服药至生效。 注重事项血栓性静脉炎、肺栓塞患者，

肝肾疾患者，与雌激素有关的肿瘤患者（如乳腺癌、阴道癌、子宫颈癌）及孕妇禁用。 1.用药期间定期进行妇科检查。 2.子宫肌瘤、心脏病、癫痫、糖尿病及高血压患者慎用。 3.注射前充分摇匀，或加热摇匀。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com