

尼尔雌醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B0\\_BC\\_E5\\_B0\\_94\\_E9\\_9B\\_8C\\_E9\\_c22\\_313676.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_B0_BC_E5_B0_94_E9_9B_8C_E9_c22_313676.htm) 药品名称尼尔雌醇药物别名（戊炔雌二醇，E3醚，Nylestriol，CEE3

，Ethinylestriol-3-cyclopentyl Ether）英文名称Nilestriol 类别雌激素及其类似合成药物性状白色或类白色结晶性粉末。在氯仿中易溶，在丙酮中溶解，在乙醇中略溶，在水中几乎不溶。熔点160~165。制剂片剂：每片1mg；2mg；5mg。分子式成分药理及应用是雌二醇衍生物，为口服长效雌激素。其口服雌激素活性为快雌醚的3倍，作用维持时间较长。特点与雌三醇相同，能选择性作用于阴道和子宫颈管，而对子宫实体、子宫内膜作用很小。口服吸收优于雌三醇，在体内代谢为乙炔雌三醇和雌二醇，缓慢从尿中排泄。实验证实，雌三醇类物质血浆 $t_{1/2}$ 为20小时左右。临床用于雌激素缺乏引起的绝经期或更年期综合征，如潮热、出汗、头痛、目眩、疲惫、烦躁易怒、神经过敏、外阴干燥、老年性阴道炎等。用法用量口服：1次5mg，每月1次。症状改善后维持量为每次1~2mg，每月2次，3个月为一疗程。注重事项少数人可有白带增多、乳房胀、恶心、头痛、腹胀等突破性出血量过多时需停药外，一般不需停药。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)