

己烯雌酚〔PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_B7_B1_E7_83_AF_E9_9B_8C_E9_c22_313679.htm 药品名称己烯雌酚〔
药物别名（乙酚，乙烯雌酚，人造求偶素，Stilbestrol）英文名称Diethylstilbestrol 类别雌激素及其类似合成药物性状无色
结晶或白色结晶性粉末；几乎无臭。在乙醇、氯仿、乙醚或
脂肪油中溶解，在水中几乎不溶，在稀氢氧化钠溶液中溶解。
熔点169~172。制剂片剂：每片0.1mg；0.25mg；0.5mg
。1mg；2mg。注射液；每支0.5mg（1ml）；1mg（1ml）
；2mg（1ml）。药理及应用为人工合成的非甾体雌激素，口
服作用为雌二醇的2~3倍，主要作用有：促使女性性器官
及副性征正常发育；促使子宫内膜增生和阴道上皮角化；
减轻妇女更年期或妇科手术后因性腺功能不足而产生的全
身性紊乱；增强子宫收缩，提高子宫对催产素的敏感性；
小剂量刺激、而大剂量抑制垂体前叶促性腺激素及催乳激
素的分泌；抗雄激素作用。口服吸收良好，经肝缓慢灭活
，代谢物从尿和粪便排泄。适应症临床用于卵巢功能不全或
垂体功能异常引起的各种疾病、闭经、子宫发育不全、功能
性子宫出血、绝经期综合征、老年性阴道炎及退奶等。也用于
前列腺癌。用法用量口服，1次0.25~1mg，1日0.25~6mg。
（1）闭经：口服小剂量刺激垂体前叶分泌促性腺激素，1日
不超过0.25mg。（2）用于人工月经周期：每日服0.25mg，连
用20天，待月经后再用同法治疗，共3周期。（3）用于月经
周期延长及子宫发育不全：每日服0.1~0.2mg，持续半年，经
期停药。（4）治疗功能性子宫出血：每晚服0.5~1mg，连
服20天。（5）用于绝经期综合征：每日服0.25mg，症状控制

后改为每日0.1mg（如同时每日舌下合服甲基睾酮5~10mg，效果更好）。（6）退奶：每次服5mg，1日2~3次，连服3天；或肌注每日1次4mg，连用3~5天，同时紧束乳房，少进液体。（7）老年性阴道炎：阴道塞药，每晚塞入1~2片（每片0.2mg），共用7天。（8）配合手术用于前列腺癌：每日3mg，3次分服，连用2~3月。维持量每日1mg。（9）用于因子宫发育不好及子宫颈分泌物粘稠所致不育症：以小剂量促使宫颈粘液稀薄，精子易透入，于月经后每日服0.1mg，共15天，疗程3~6月。（10）用于稽留流产（怀孕7个月以内死胎，经2个月或以上仍未娩出）：每次服5mg，1日3次，5~7日为一疗程，停药5天，如无效可重复一疗程。

注重事项
（1）可有恶心、呕吐、厌食、头痛等。长期应用可使子宫内膜增生过度而导致子宫出血与子宫肥大。（2）应按指定方法服药，中途停药可导致子宫出血。（3）肝、肾病患者及孕妇禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com