

酚苄明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E9_85_9A_E8_8B_84_E6_98_8E_c22_313683.htm 药品名称酚苄明 英文名称phenoxybenzamine 类别前列腺增生症用药药理及应用人体前列腺对肾上腺素（ α -受体兴奋剂）的敏感性比膀胱高出数十倍，任何引起交感神经兴奋的刺激都可导致前列腺增生患者急性尿潴留。作为 α -肾上腺素能受体阻滞剂的本品，可选择性地松弛前列腺组织及膀胱颈平滑肌，而不影响膀胱逼尿肌的收缩，从而缓解梗阻，顺畅排尿。用于前列腺增生患者可使其尿频、尿急、排尿困难等症状改善，残余尿量减少。本品口服后数小时开始起作用，作用可持续3~4日。 $t_{1/2}$ 约为24小时。在肝内代谢，大部分于24小时内从肾和胆汁排出。用法用量每次服10mg（1片）。开始1~3日，每日2次；以后每日1次。7~14日为1疗程。注重事项（1）服后可有轻度的口干、鼻塞、头晕、乏力、胃肠道刺激等症状，个别患者有心悸、早搏。（2）服药后应稍事休息，以防体位性低血压。（3）近期有严重心血管和脑血管疾病者禁用。（4）不宜与胍乙啶、拟交感胺类药物合用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com