

阿克那霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E9\\_98\\_BF\\_E5\\_85\\_8B\\_E9\\_82\\_A3\\_E9\\_c22\\_313708.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E9_98_BF_E5_85_8B_E9_82_A3_E9_c22_313708.htm) 药品名称阿克那霉素

英文名称Aclacinomycin 类别抗肿瘤抗生素药理毒理本品为新的第二代蒽环类抗肿瘤抗生素，具有广谱抗肿瘤活性，能与肿瘤细胞DNA结合，并可抑制核酸合成，尤其对抑制RNA合成效果更显著。适应症急性白血病、恶性淋巴瘤、胃癌、肺癌、乳腺癌和卵巢癌等不良反应1 有心脏毒性，可出现心律失常。2 骨髓抑制。3 胃肠道反应。4 肝、肾功能损害。用法用量使用前用生理盐水或5%葡萄糖注射液溶解。1 实体瘤和恶性淋巴瘤推荐剂量 40mg ~ 50mg(0.8mg ~ 1.0mg/kg)，2次/周，分别在1、2或1、4两日，可直接静脉注射或静滴。

20mg(0.4mg/kg)静注，1次/日，共7日，每隔1周重复给药，可直接静脉注射或静滴。2 急性白血病推荐剂量

20mg(0.4mg/kg)静注，1次/日，每疗程10 ~ 15日，可直接静注或静滴。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)