

炔雌醚 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E7\\_82\\_94\\_E9\\_9B\\_8C\\_E9\\_86\\_9A\\_c22\\_313709.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_82_94_E9_9B_8C_E9_86_9A_c22_313709.htm) 药品名称炔雌醚药物别名（炔雌醇环戊醚，CEE，Estrovis

，Ethinylestradiol-3-cyclopentylether 英文名称Quinestrol 类别雌激素及其类似合成药物性状白色或几乎白色结晶或结晶性粉末。在乙醇、乙酸乙酯、丙酮或氯仿中溶解，在水中几乎不溶。熔点106~112。制剂片剂：每片0.025mg；4mg。分子式成分药理及应用为作用较强的口服长效雌激素，其活性为炔雌醇的4倍。口服后贮存在体内脂肪中，并缓慢释放，代谢为炔雌醇而生效，作用可维持一个月以上。代谢物与葡萄糖醛酸结合缓慢从尿中排泄。临床用于绝经期综合征及退奶等。本品与孕激素合用可作为口服长效避孕药。用法用量口服：用于绝经期综合征，每日口服0.025mg，或每周1次0.1~0.2mg。退奶，于分娩后6小时内1次口服4mg，必要时隔4~6天服第二次；对已哺乳者，1次4mg，两天后服第二次。注意事项可有恶心、呕吐、乳房胀痛、白带增多等。肝、肾病患者忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)