

吡拉西坦 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_90\\_A1\\_E6\\_8B\\_89\\_E8\\_A5\\_BF\\_E5\\_c22\\_313714.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_90_A1_E6_8B_89_E8_A5_BF_E5_c22_313714.htm) 药品名称吡拉西坦药物别名吡乙酰胺，酰胺吡酮，酰胺吡，咯烷酮，吡烷酮醋胺，脑复康 英文名称Piracetam 类别用于治疗老年性痴呆的药物制剂个别患者服药后出现口干、纳差、失眠、荨麻疹、呕吐等症状，停药后可自行消失。药理及应用为  $\gamma$ -氨基丁酸的衍生物，可直接作用于大脑皮质，具有激活、保护和修复神经细胞的作用。动物实验显示，能促进学习能力，推迟缺氧性记忆障碍的产生，提高大脑对葡萄糖的利用率和能量贮备，改善大脑功能。国外报告对改善轻度及中度老年痴呆者的认知能力有效，但对重度痴呆者无效。对因衰老、机能障碍引起的功能衰退性征候群如老年性反应迟钝、意识障碍等亦可获一定效果，使症状得到改善。此外，尚可用于治疗脑外伤所致记忆减退。国内临床上主要用于治疗记忆和思维障碍，对由于衰老、脑血管意外、一氧化碳中毒等原因引起的记忆、思维障碍、中风、偏瘫均有一定疗效。对某些儿童智能低下和夜尿症也有疗效。本品对中枢作用选择性强，仅限于脑功能（记忆、意识等）的改善，精神兴奋作用弱，无精神药物的副作用，无依赖性。口服后可分布到大部分组织器官，眼后30~40分钟可达最大血药浓度，蛋白结合率30%， $t_{1/2}$ 为4~6小时。易通过血脑屏障及胎盘屏障。直接经肾清除，在26~30小时内给药量的94%~98%以原形由尿排出。用法用量1日3次，每次服800mg（2片），重症可加至每次1600mg（4片），1日3次。儿童每次给予40mg/kg。一般3~6周为1疗程。服完一疗程后，维持剂量减半，或遵医嘱。

注重事项个别患者服药后出现口干、纳差、失眠、荨麻疹、  
呕吐等症状，停药后可自行消失。100Test 下载频道开通，各  
类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)