

普美孕酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E6\\_99\\_AE\\_E7\\_BE\\_8E\\_E5\\_AD\\_95\\_E9\\_c22\\_313719.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E6_99_AE_E7_BE_8E_E5_AD_95_E9_c22_313719.htm) 药品名称普美孕酮  
药物别名 ( surgestone ) 英文名称promegestone [ ] 类别孕激素类  
性状无色结晶，熔点152 。溶于丙酮、苯，不溶于水。  
制剂片剂：每片0.125mg；0.25mg；0.5mg。药理及应用为19去甲孕酮类孕激素，其活性比黄体酮强100倍，并无雄激素和雌激素活性。口服吸收迅速，经1小时血浓度达峰值， $t_{1/2}$  ~ 12小时。临床适用于黄体功能不足所致疾患，如月经紊乱、痛经、子宫内膜异位症、经前综合征、乳房痛、月经过多或功能性出血、绝经前失调、绝经期综合征。用法用量口服：于月经周期第16 ~ 25天，每日1次0.125 ~ 0.5mg。用于绝经期，于月经周期第1 ~ 21天，每日口服雌二醇2mg，第14 ~ 15天，每日1次0.125 ~ 0.5mg。用于子宫内膜异位症，每日1次0.5 ~ 1mg。注重事项可有闭经、点滴出血、皮脂溢、体重增加、胃肠障碍等。有血栓病史、糖尿病者及孕妇、哺乳妇慎用。肝病忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)